

BEAUTY

Loft

A P E L D O O R N

Dit moet je weten over Permanente Make-Up

- PMU blijft gemiddeld 1,5-2 jaar goed zitten. Daarna zal het vervagen.
- PMU valt op elke huid anders. Bij de een pakt het de eerste keer gelijk goed, de andere huid stoot de inkt meer af. Daarom bestaat de behandeling uit twee, soms drie sessies.
- Een touch-up is meestal één behandeling. Dit is niet voor iedereen voldoende vooral wanneer je een wat vette huid hebt, grovere poriën of een litteken. Wil je een andere vorm dan geldt dit ook als touch up.
- Tijdens de zwangerschap, in het geval van eczeem of andere huidaandoeningen rond de wenkbrauwen kunnen wij de behandeling niet uitvoeren.
- Bij het gebruik van bloedverdunners, indien mogelijk een paar dagen voorafgaand aan de behandeling ermee te stoppen.
- PMU is geen vervanging van make-up. Het is de bedoeling dat je met mooie natuurlijke make-up wakker wordt. Een dag make-up.
- Bij bepaalde huidtypen blijft microblading in de regel minder strak en zullen ze eerder vervagen. Hoe strakker en fijner de huidstructuur, des te mooier het resultaat. Bij bepaalde huidtypen zoals een vette huid met grove poriën, is de poedertechniek ideaal. In een intake of voorafgaand gesprek kan dit besproken worden!

Informatie over de risico's van permanente make-up

Het zetten van permanente make-up brengt risico's met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de behandelaar op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoelighedsreacties. En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een PMU wilt laten zetten een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Laat geen permanente make-up aanbrengen:

- Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan.
- Op een litteken dat minder dan 6 maanden oud is.
- Op een plek waar minder dan zes weken geleden PMU is gezet.
- Op een plek waar minder dan drie maanden geleden een PMU of tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is.

- Op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen.
- Als je onder invloed bent van alcohol of drugs.
- Als je zwanger bent.

Daarnaast wordt het afgeraden om permanente make-up te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:

- Met eyeliners: als je lijdt aan oogaandoeningen, zoals diabetes retinopathie, glaucoom en staar.
- Als je koorts hebt op de behandeldag.
- Als je Roacutane (medicatie en zalf) gebruikt. Je kunt dan 3 maanden na het einde van de kuur weer behandeld worden.
- Diabetes.
- Hemofilie (bloedstollingsziekte).
- Chronische huidziekte.
- Allergie voor pigmentstoffen of andere materialen waarmee PMU wordt gezet.
- Immunistoornis.
- Hart- en vaatafwijkingen.

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.

Ben je jonger dan 16 jaar dan raden we PMU af.

Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico's op www.veiligtaoereenenpiercen.nl

Het zetten van permanente make-up

Omdat er tijdens het zetten van permanente make-up een wond ontstaat is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken. Let er in ieder geval op dat:

- De huid voor het zetten van de PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd.
- De naalden en inkt steriel verpakt en alleen voor jou worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt, inkt zit in kleine inktcupjes.
- Tijdens het zetten schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken.
- De behandelaar tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een tissue of je huid.
- De permanente make-up na afloop wordt verzorgd.

Belangrijk om te weten voordat je de behandeling ondergaat

- Neem geen alcoholische dranken 24 uur voor de behandeling.
- Drink een aantal dagen van te voren geen groene thee en neem geen voedingssupplementen (vooral letten op A en E). Door de antioxidanten pakt de PMU mogelijk minder goed.
- Neem 24 uur van te voren geen Aspirine en geen ontstekingsremmende geneesmiddelen (nsaid's) zoals Ibuprofen of Naproxen. Paracetamol mag wel.
- Neem 24 uur voorafgaand geen bloed verdunnende medicijnen (overleg met je arts).
- Gebruikt geen corticosteroiden crème of zalf ter plekke voorafgaand aan de pigmentatie.
- Het is niet aan te raden intensief te sporten de dag van de behandeling. Door de hitte van het lichaam kunnen de poriën openstaan en dat kan ervoor zorgen dat de kleuren meer gaan vervagen.
- Daarnaast adviseren wij om geen behandeling tijdens de menstruatie week in te plannen, de pigmenten pakken dan mogelijk minder goed en daarnaast is de behandeling in deze periode gevoeliger.
- Als je jouw wenkbrauwkaartjes bleekt is het af te raden deze behandeling te ondergaan, de chemicaliën zullen ook het pigment uit de huid bleken. De kaartjes mogen wel geverfd worden.
- Tot 2 weken voor de behandeling; geen peelings en de wenkbrauwen niet blootstellen aan de zon of zonnebank. Een zongebruinde huid wordt niet behandeld.
- Bij een eyelinerbehandeling moeten de lenzen uit. Je moet er rekening mee houden dat de lenzen mogelijk meerdere dagen niet gedragen kunnen worden (door een mogelijke zwelling en voor een betere wondgenezing) houd dus een bril bij de hand. Voor de genezing is het beter om pas na 72 uur de lenzen weer te dragen en dan de lenzen met steriel water afspoelen voorafgaand het in de ogen te plaatsen. Enerzijds omdat het in en uit doen van lenzen bacteriën met zich mee kan brengen wat mogelijk tot infecties kan leiden en anderzijds omdat lenzenvloeistof bestaat uit een zoutoplossing en zout trekt het pigment uit de huid.
- Bij een lipbehandeling is het beter om 2 weken voor de behandeling te stoppen met veelvuldig gebruik van labello, lip gloss en of andere lippenbalsems (veelvuldig gebruik houdt in meer dan 2 keer per dag). Lippenbalsems kunnen mogelijk de celdeling vertragen wat invloed kan hebben op het resultaat van PMU.
- Als je ooit een koortslip heeft gehad en je wilt toch graag een lipbehandeling ondergaan, volg dan het volgende advies op:
Neem 1 week van te voren 1000 mg tot 2000 mg L-Lysine en vitamine Esther-C tabletten (de merken Solgar en Orthica zijn goed). Smeer met Zovirax crème, zodra er een prikkeling komt, dit is verkrijgbaar bij de reguliere drogist. 7 dagen na de behandeling kun je met de voedingssupplementen stoppen.